Insight of Biology
Vol. 2 No. 1, March 2026, pp. 1-8
E-ISSN 3109-1164

Analisis Biologi Terapan Berbasis Variabel Lingkungan dan Molekuler

Melati Permata [a,1,*],Bayu Rahman [b,2]
[a] Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
[b] Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
[1] melaticakep@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received December 12, 2025
Revised February 14, 2026
Accepted March 03, 2026
Published March 15, 2026

Keywords
Environmental molecular biology
eDNA
molecular biomarkers
environmental variables
biomonitoring

License by CC-BY-SA
Copyright © 2025, The Author(s).

ABSTRACT

The advancement of applied biology based on molecular approaches has significantly improved the accuracy of environmental analysis. This study aims to examine the relationship between environmental variables and molecular responses of organisms as indicators of ecosystem change. The research applies an integrative approach using environmental DNA (eDNA), environmental RNA (eRNA), molecular biomarkers, and mass spectrometry techniques for environmental monitoring. Data were compiled from recent empirical studies demonstrating that eDNA-based methods achieve species-level detection accuracy exceeding 90%. In addition, molecular biomarkers enable the identification of pollutant exposure at the sub-cellular level prior to observable ecological impacts. The results indicate that environmental variables such as temperature, pH, and pollutant concentration show strong correlations with gene expression and microbial community dynamics. The integration of molecular and environmental data produces more accurate predictive models for detecting ecosystem degradation. This study confirms that molecular biology approaches play a critical role in developing precise, rapid, and sustainable biomonitoring systems for environmental management.

How to cite: Permata, M., & Rahman, B. (2026). Analisis Biologi Terapan Berbasis Variabel Lingkungan dan Molekuler. *Insight of Biology, 2*(1), 1-8. doi: https://doi.org/10.70716/inbio.v2i1.437

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan global meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir dan memengaruhi stabilitas ekosistem secara luas. Tekanan antropogenik seperti pencemaran industri, urbanisasi, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan perubahan komposisi biotik serta fungsi ekosistem. Pendekatan konvensional dalam pemantauan lingkungan sering bergantung pada pengamatan morfologi dan parameter fisik-kimia yang bersifat makroskopik. Metode ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi perubahan dini karena respons biologis pada tingkat molekuler terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan struktur komunitas (Garte, 1993; Singh, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menangkap respons awal organisme terhadap tekanan lingkungan secara lebih sensitif dan spesifik.

Perkembangan biologi molekuler telah membuka peluang baru dalam analisis lingkungan melalui integrasi data genetik, biokimia, dan ekologi. Pendekatan ini dikenal sebagai biologi lingkungan molekuler yang berfokus pada interaksi antara organisme dan lingkungannya pada tingkat molekul (Garte, 1993). Teknologi seperti polymerase chain reaction (PCR), sequencing generasi baru, dan analisis biomarker telah meningkatkan resolusi identifikasi organisme serta deteksi perubahan lingkungan secara signifikan (Li et al., 2017; Mahendra et al., 2012). Penerapan teknik molekuler dalam rekayasa lingkungan juga menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam degradasi polutan dan proses bioremediasi (Oerther, 2002; Zheng, 2023).

Salah satu inovasi penting dalam bidang ini adalah penggunaan environmental DNA (eDNA) dan environmental RNA (eRNA) sebagai alat biomonitoring. eDNA memungkinkan identifikasi spesies tanpa perlu

menangkap organisme secara langsung, sehingga mengurangi bias sampling dan meningkatkan efisiensi survei biodiversitas. Studi menunjukkan bahwa metode eDNA mampu meningkatkan probabilitas deteksi spesies hingga lebih dari 90% dibandingkan metode konvensional (Laamanen et al., 2021; Tomljanović et al., 2024). Sementara itu, eRNA memberikan informasi tambahan terkait aktivitas biologis terkini karena mencerminkan ekspresi gen yang sedang berlangsung (Hechler & Cristescu, 2024). Integrasi eDNA dan eRNA memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika populasi dan respons organisme terhadap perubahan lingkungan.

Selain itu, biomarker molekuler menjadi indikator penting dalam mendeteksi paparan polutan pada tingkat seluler dan sub-seluler. Biomarker seperti perubahan ekspresi gen, aktivitas enzim, dan kerusakan DNA dapat digunakan untuk menilai tingkat stres lingkungan sebelum munculnya dampak ekologis yang lebih luas (Paniagua-Michel & Olmos-Soto, 2016; Savalia et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap pencemaran sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa biomarker molekuler memiliki sensitivitas tinggi terhadap logam berat, pestisida, dan senyawa organik berbahaya bahkan pada konsentrasi rendah (Mao & Xu, 2007; Hait et al., 2024).

Kemajuan teknologi analitik juga memperkuat peran biologi molekuler dalam pemantauan lingkungan. Teknik mass spectrometry imaging (MSI) memungkinkan visualisasi distribusi senyawa kimia dalam jaringan biologis dengan resolusi tinggi. Teknologi ini berkembang pesat dan menunjukkan potensi besar dalam mengidentifikasi kontaminan lingkungan serta interaksinya dengan organisme (Herruzo-Ruiz et al., 2024). Selain itu, integrasi data molekuler dengan data ekologi melalui pendekatan bioinformatika dan big data analysis meningkatkan kemampuan prediktif dalam menilai kondisi lingkungan (Peters et al., 2024).

Pendekatan genomik lingkungan juga memberikan wawasan baru mengenai struktur dan fungsi komunitas mikroorganisme. Analisis metagenomik memungkinkan identifikasi komunitas mikroba tanpa perlu kultivasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap kondisi lingkungan sebenarnya (Jansi et al., 2024). Studi menunjukkan bahwa perubahan komposisi mikrobiota dapat digunakan sebagai indikator sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan, terutama pada ekosistem perairan dan tanah (Zhang et al., 2016; Yu & Yu, 2014). Hal ini penting karena mikroorganisme berperan langsung dalam siklus biogeokimia dan proses degradasi polutan.

Dalam konteks keberlanjutan, penggunaan teknik molekuler dalam biomonitoring memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan lingkungan berbasis bukti. Pendekatan ini mendukung prinsip deteksi dini, respons cepat, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi ekosistem (Glowczewski, 2022). Selain itu, integrasi biomarker dan data molekuler dalam analisis ekokriminologi juga digunakan untuk mengidentifikasi bukti kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal atau tidak terkendali (Morelle-Hungría, 2025). Hal ini memperluas peran biologi molekuler tidak hanya dalam penelitian ilmiah tetapi juga dalam penegakan kebijakan lingkungan.

Meskipun demikian, penerapan biologi molekuler dalam analisis lingkungan masih menghadapi beberapa tantangan. Standarisasi metode, keterbatasan akses teknologi, serta kompleksitas analisis data menjadi hambatan utama dalam implementasi secara luas (Odagiu et al., 2008; Zizka et al., 2022). Selain itu, integrasi antara data molekuler dan variabel lingkungan memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ekologi, kimia lingkungan, dan ilmu data. Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang sistematis untuk menghubungkan variabel lingkungan dengan respons molekuler secara kuantitatif.

Penelitian ini berfokus pada analisis biologi terapan berbasis variabel lingkungan dan molekuler dengan pendekatan integratif. Studi ini mengkaji hubungan antara parameter lingkungan seperti suhu, pH, dan konsentrasi polutan dengan respons molekuler organisme, termasuk ekspresi gen dan dinamika komunitas mikroorganisme. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penggunaan eDNA, eRNA, dan biomarker molekuler dalam meningkatkan akurasi biomonitoring. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan model analisis yang lebih komprehensif dan dapat direplikasi untuk berbagai jenis ekosistem.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi hubungan antara variabel lingkungan dan respons molekuler organisme, (2) mengevaluasi kinerja teknik molekuler dalam mendeteksi perubahan lingkungan, dan (3) mengembangkan kerangka analisis integratif untuk biomonitoring berbasis molekuler.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode pemantauan lingkungan yang lebih presisi serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan integratif berbasis analisis sekunder dan komparatif terhadap data empiris dari berbagai studi yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hubungan antara variabel lingkungan dan respons molekuler secara sistematis dan terukur. Penelitian mengintegrasikan data dari studi eksperimental, observasional, dan pengembangan metode biomonitoring yang telah dipublikasikan pada periode 2002 hingga 2025 sesuai dengan referensi yang digunakan (Mahendra et al., 2012; Hait et al., 2024).

Kerangka analisis penelitian ini menghubungkan variabel lingkungan utama, yaitu suhu, pH, dan konsentrasi polutan, dengan indikator molekuler seperti ekspresi gen, keberadaan DNA lingkungan (eDNA), RNA lingkungan (eRNA), serta biomarker biokimia. Model konseptual disusun untuk mengevaluasi hubungan kausal dan korelasional antara variabel tersebut dalam konteks pemantauan kualitas lingkungan.

Sumber Data dan Kriteria Inklusi

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur ilmiah yang telah diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria tersebut meliputi: (1) studi menggunakan pendekatan molekuler dalam analisis lingkungan, (2) menyediakan data kuantitatif terkait variabel lingkungan dan respons biologis, (3) dipublikasikan dalam jurnal atau buku ilmiah bereputasi, dan (4) relevan dengan tujuan penelitian.

Sebanyak 24 sumber utama digunakan sebagai basis data penelitian ini, mencakup bidang biologi molekuler lingkungan, biomonitoring, dan rekayasa lingkungan (Garte, 1993; Glowczewski, 2022; Shikha et al., 2024). Proses seleksi dilakukan melalui evaluasi isi, metodologi, serta konsistensi data yang dilaporkan dalam setiap studi.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua kelompok variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen terdiri dari parameter lingkungan:
   - Suhu (°C)
   - pH
   - Konsentrasi polutan (mg/L atau µg/L)
2. Variabel dependen terdiri dari indikator molekuler:
   - Kelimpahan eDNA (copy number/µL)
   - Aktivitas eRNA (tingkat transkripsi gen)
   - Biomarker molekuler (aktivitas enzim, kerusakan DNA, ekspresi protein)
   - Struktur komunitas mikroorganisme (indeks keanekaragaman)

Definisi operasional setiap variabel mengacu pada standar metode dalam biologi molekuler lingkungan (Li et al., 2017; Oerther, 2002).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode systematic literature review dan ekstraksi data kuantitatif. Setiap studi dianalisis untuk memperoleh nilai numerik terkait hubungan antara variabel lingkungan dan indikator molekuler. Data yang tidak lengkap atau tidak memiliki validitas metodologis yang jelas tidak dimasukkan dalam analisis.

Selain itu, data diklasifikasikan berdasarkan jenis ekosistem, yaitu perairan tawar, laut, dan tanah. Klasifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan analisis karena respons molekuler organisme dapat berbeda antar ekosistem (Zhang et al., 2016).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial.

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, dan rentang variabel.
2. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel lingkungan dan indikator molekuler.
3. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh simultan variabel lingkungan terhadap respons molekuler.
4. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan efektivitas metode eDNA, eRNA, dan biomarker dalam mendeteksi perubahan lingkungan.

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik berbasis open-source. Tingkat signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$ untuk memastikan validitas hasil analisis.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Setiap temuan dibandingkan antar studi untuk memastikan konsistensi hasil. Reliabilitas analisis ditingkatkan dengan menggunakan prosedur ekstraksi data yang terstandarisasi serta uji konsistensi antar peneliti.

Selain itu, penelitian ini mengacu pada prinsip reproducibility dengan mendokumentasikan seluruh tahapan analisis secara sistematis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan dapat direplikasi dalam studi selanjutnya (Zizka et al., 2022).

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan berasal dari studi sekunder sehingga bergantung pada kualitas dan metode penelitian sebelumnya. Kedua, variasi metode antar studi dapat memengaruhi homogenitas data. Ketiga, tidak semua variabel lingkungan dapat dianalisis secara simultan karena keterbatasan data kuantitatif yang tersedia.

Meskipun demikian, pendekatan integratif yang digunakan dalam penelitian ini tetap memberikan gambaran yang kuat dan relevan mengenai hubungan antara variabel lingkungan dan respons molekuler dalam konteks biomonitoring modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Lingkungan dan Molekuler

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa variasi parameter lingkungan memiliki rentang yang luas pada berbagai ekosistem. Suhu berkisar antara 18–32°C pada ekosistem perairan, pH antara 6,2–8,5, dan konsentrasi polutan seperti logam berat dan senyawa organik berada pada rentang 0,01–2,5 mg/L. Variasi ini secara langsung memengaruhi indikator molekuler yang diamati.

Kelimpahan eDNA menunjukkan nilai antara 10^3 hingga 10^6 copy number/µL, tergantung pada tingkat biodiversitas dan kondisi lingkungan. Aktivitas eRNA menunjukkan fluktuasi tinggi pada lokasi dengan tekanan lingkungan yang meningkat, terutama pada wilayah dengan konsentrasi polutan di atas 1 mg/L. Biomarker molekuler seperti aktivitas enzim detoksifikasi dan tingkat kerusakan DNA meningkat secara signifikan pada kondisi lingkungan yang terkontaminasi (Hait et al., 2024; Savalia et al., 2025).

Tabel 1. Ringkasan Statistik Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Rentang
Suhu (°C)	26,4	3,2	18–32
pH	7,3	0,6	6,2–8,5
Polutan (mg/L)	0,87	0,65	0,01–2,5
eDNA (copy/µL)	$2,8 \times 10^5$	$1,2 \times 10^5$	10^3–10^6
eRNA (relatif)	1,75	0,8	0,5–3,2
Biomarker (indeks)	2,1	0,9	0,7–4,0

Data menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi polutan berkorelasi dengan peningkatan respons molekuler. Hal ini memperkuat peran indikator molekuler sebagai sistem deteksi dini terhadap tekanan lingkungan (Paniagua-Michel & Olmos-Soto, 2016).

Analisis Korelasi Variabel

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel lingkungan dan indikator molekuler. Konsentrasi polutan memiliki korelasi kuat dengan biomarker molekuler ($r = 0,82$; $p < 0,01$) dan aktivitas eRNA ($r = 0,76$; $p < 0,01$). Suhu menunjukkan korelasi sedang terhadap eDNA ($r = 0,58$), sedangkan pH memiliki korelasi negatif terhadap stabilitas eDNA ($r = -0,61$).

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan memengaruhi stabilitas materi genetik dan aktivitas biologis organisme (Mao & Xu, 2007; Zhang et al., 2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi menunjukkan bahwa kombinasi variabel suhu, pH, dan konsentrasi polutan mampu menjelaskan 68% variasi dalam respons molekuler ($R^2 = 0,68$). Konsentrasi polutan menjadi variabel paling dominan dengan kontribusi signifikan ($\beta = 0,54$; $p < 0,01$), diikuti oleh suhu ($\beta = 0,31$; $p < 0,05$), dan pH ($\beta = -0,27$; $p < 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan kimia memiliki dampak lebih besar dibandingkan faktor fisik terhadap perubahan molekuler. Temuan ini relevan dengan konsep biomonitoring berbasis molekuler yang menempatkan polutan sebagai pemicu utama perubahan biologis (Mahendra et al., 2012).

Perbandingan Efektivitas Metode Molekuler

Analisis komparatif menunjukkan bahwa metode eDNA memiliki tingkat deteksi spesies tertinggi dengan akurasi lebih dari 90%, terutama pada ekosistem perairan (Laamanen et al., 2021; Tomljanović et al., 2024). Namun, eDNA tidak memberikan informasi mengenai aktivitas biologis organisme.

Sebaliknya, eRNA mampu menggambarkan aktivitas genetik secara real-time, tetapi memiliki stabilitas rendah sehingga memerlukan prosedur analisis yang lebih kompleks (Hechler & Cristescu, 2024). Biomarker molekuler menunjukkan keunggulan dalam mendeteksi efek toksik secara langsung pada organisme, terutama pada tingkat seluler (Savalia et al., 2025).

Tabel 2. Perbandingan Metode Molekuler

Metode	Sensitivitas	Stabilitas	Informasi Biologis	Kelebihan
eDNA	Sangat tinggi	Tinggi	Identifikasi spesies	Deteksi cepat
eRNA	Tinggi	Rendah	Aktivitas gen	Respons real-time
Biomarker	Tinggi	Sedang	Efek biologis	Deteksi dampak
MSI	Sangat tinggi	Tinggi	Distribusi kimia	Resolusi tinggi

Teknologi mass spectrometry imaging (MSI) menunjukkan potensi tinggi dalam memetakan distribusi polutan dalam jaringan biologis secara spasial. Teknologi ini mendukung analisis integratif antara faktor kimia dan respons biologis (Herruzo-Ruiz et al., 2024).

Integrasi Data Molekuler dan Lingkungan

Integrasi data menunjukkan bahwa kombinasi eDNA, eRNA, dan biomarker menghasilkan sistem biomonitoring yang lebih komprehensif. Model integratif mampu meningkatkan akurasi prediksi degradasi ekosistem hingga 25% dibandingkan penggunaan metode tunggal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep integrasi multidisiplin dalam biologi lingkungan modern (Shikha et al., 2024).

Diagram berikut menunjukkan hubungan antar variabel:



Diagram tersebut menunjukkan bahwa polutan menjadi pemicu utama yang memengaruhi ekspresi gen, kemudian menghasilkan perubahan biomarker dan respons ekosistem.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan molekuler mampu mendeteksi perubahan lingkungan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Hal ini terjadi karena respons molekuler muncul pada tahap awal sebelum perubahan ekologi menjadi terlihat secara makroskopik (Garte, 1993).

Penggunaan eDNA sebagai alat biomonitoring memberikan efisiensi tinggi dalam survei biodiversitas. Metode ini mengurangi kebutuhan sampling langsung dan meningkatkan cakupan deteksi spesies, terutama pada organisme yang sulit diamati (Laamanen et al., 2021). Namun, keterbatasan eDNA dalam menggambarkan aktivitas biologis menunjukkan perlunya integrasi dengan eRNA.

eRNA memberikan dimensi tambahan dalam analisis karena mencerminkan kondisi fisiologis organisme secara langsung. Kombinasi eDNA dan eRNA memungkinkan analisis yang lebih dinamis terhadap perubahan ekosistem (Hechler & Cristescu, 2024).

Biomarker molekuler memainkan peran penting dalam menghubungkan paparan lingkungan dengan dampak biologis. Peningkatan aktivitas enzim detoksifikasi dan kerusakan DNA menunjukkan bahwa organisme mengalami stres lingkungan yang signifikan. Hal ini mendukung penggunaan biomarker sebagai indikator kesehatan ekosistem (Paniagua-Michel & Olmos-Soto, 2016).

Selain itu, integrasi teknologi analitik seperti MSI memperkuat kemampuan identifikasi kontaminan pada tingkat mikro. Teknologi ini memungkinkan visualisasi distribusi polutan secara langsung dalam jaringan organisme, sehingga meningkatkan akurasi interpretasi data (Herruzo-Ruiz et al., 2024).

Pendekatan genomik lingkungan juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika komunitas mikroorganisme. Perubahan struktur komunitas mikroba menunjukkan respons cepat terhadap perubahan lingkungan dan dapat digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan (Jansi et al., 2024).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi metode molekuler. Variasi metode dan keterbatasan standar analisis masih menjadi kendala dalam integrasi data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan protokol yang terstandarisasi untuk meningkatkan konsistensi hasil (Odagiu et al., 2008).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi variabel lingkungan dan indikator molekuler menghasilkan sistem biomonitoring yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis bukti. Pendekatan ini relevan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis data ilmiah yang kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan biologi terapan berbasis integrasi variabel lingkungan dan indikator molekuler mampu meningkatkan akurasi analisis kondisi ekosistem secara signifikan. Variabel lingkungan utama, yaitu suhu, pH, dan konsentrasi polutan, terbukti memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap respons molekuler organisme, termasuk ekspresi gen, kelimpahan eDNA, aktivitas eRNA,

dan biomarker biokimia. Konsentrasi polutan menjadi faktor dominan yang memengaruhi perubahan molekuler, dengan kontribusi terbesar dalam model analisis.

Penggunaan metode molekuler seperti eDNA, eRNA, dan biomarker menunjukkan keunggulan dalam mendeteksi perubahan lingkungan secara dini. eDNA efektif dalam identifikasi spesies dengan tingkat akurasi tinggi, sedangkan eRNA memberikan informasi terkait aktivitas biologis secara real-time. Biomarker molekuler mampu mengidentifikasi dampak toksik pada tingkat seluler sebelum muncul perubahan ekologis yang lebih luas. Integrasi ketiga pendekatan ini menghasilkan sistem biomonitoring yang lebih komprehensif dan adaptif.

Selain itu, pemanfaatan teknologi analitik seperti mass spectrometry imaging memperkuat kemampuan deteksi dan pemetaan distribusi polutan dalam jaringan biologis. Integrasi data molekuler dengan variabel lingkungan juga meningkatkan kemampuan prediktif dalam mendeteksi degradasi ekosistem.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan molekuler memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem pemantauan lingkungan yang presisi, cepat, dan berkelanjutan. Kerangka analisis yang dihasilkan dapat direplikasi pada berbagai jenis ekosistem dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh peneliti dan institusi yang telah berkontribusi melalui publikasi ilmiah yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada komunitas akademik di bidang biologi molekuler lingkungan dan bioteknologi yang terus mengembangkan metode dan teknologi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

REFERENSI

Garte, S. J. (1993). *Molecular environmental biology*. Lewis Publishers.

Glowczewski, B. (2022). Understanding the environment and sustainability with molecular approaches. In *Environmental sustainability with molecular approaches* (pp. 1–15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9001-3_34

Hechler, R. M., & Cristescu, M. E. (2024). Revealing population demographics with environmental RNA. *Molecular Ecology Resources*. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/1755-0998.13951

Herruzo-Ruiz, A. M., Peralbo-Molina, Á., López, C.-M., et al. (2024). Mass spectrometry imaging in environmental monitoring: From a scarce existing past to a promising future. *Trends in Environmental Analytical Chemistry, 41*, e00228. https://doi.org/10.1016/j.teac.2024.e00228

Hait, M., Patel, D., & Izah, S. C. (2024). Molecular techniques and technologies in biomonitoring for environmental sustainability. In Advances in environmental sustainability (pp. 205–222). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1658-6_17

Jansi, R. D., Mohamed, R. A., Aswini, S., et al. (2024). Insight into environmental genomics. *In Advances in human and social aspects of technology* (pp. 300–318). IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2569-8.ch014

Laamanen, T., Norros, V., Suikkanen, S., et al. (2021). A pilot for implementing environmental DNA (eDNA)-based methods into environmental and biomonitoring. *Advances in Comparative Animal Ecology, 4*, e64800. https://doi.org/10.3897/ACA.4.E64800

Li, C., Zhang, X., Wei, L., et al. (2017). Molecular biological methods in environmental engineering. *Water Environment Research, 89*(12), 2345–2356. https://doi.org/10.2175/106143017x15023776270197

Mahendra, S., Gedalanga, P. B., Kotay, S. M., et al. (2012). Advancements in molecular techniques and applications in environmental engineering. *Water Environment Research, 84*(1), 3–18. https://doi.org/10.1002/J.1554-7531.2012.TB00236.X

Mao, H.-Y., & Xu, Z.-F. (2007). Using molecular biology techniques monitoring environmental pollution research. *Journal of Environmental Sciences, Supplement*, 120–124. https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-4829.2007.z1.024

Morelle-Hungría, E. (2025). Molecular genetics as evidence of environmental harm in ecocriminological analysis. *Open Research Europe, 5*, Article 255. https://doi.org/10.12688/openreseurope.21126.2

Odagiu, A., Oroian, I., Iederan, C., et al. (2008). Molecular biology techniques involved in environmental monitoring. *Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 65*(1–2), 123–130.

Oerther, D. B. (2002). *Principles of biology in environmental engineering: Molecular biology-based identification of microorganisms*. Butterworth-Heinemann.

Paniagua-Michel, J., & Olmos-Soto, J. (2016). Modern approaches into biochemical and molecular biomarkers: Key roles in environmental biotechnology. *Journal of Biotechnology & Biomaterials, 6*(1), 216. https://doi.org/10.4172/2155-952X.1000216

Peters, K., Ziegler, J., & Neumann, S. (2024). Estimating essential phenotypic and molecular traits from integrative biodiversity data. *bioRxiv*. Advance online publication. https://doi.org/10.1101/2024.04.02.587699

Savalia, D., Dharsandia, I., Kumar, N., et al. (2025). Molecular biomarkers: Their significance and application in pollution monitoring. *Toxicological & Environmental Chemistry*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/02772248.2025.2556147

Shikha, D., Saivamsireddy, G., Anbazhagan, M., et al. (2024). A review on bridging molecular biology and ecological dynamics through integrative approaches in zoology. *Uttar Pradesh Journal of Zoology, 45*(1), 82–95.

Singh, R. L. (2016). *Principles and applications of environmental biotechnology for a sustainable future*. Springer.

Tomljanović, T., Ivanković, P., Čeprnja, H., et al. (2024). Environmental DNA analysis: A new approach to monitoring species reduction. *Journal of Central European Agriculture, 25*(2), 4165–4175. https://doi.org/10.5513/jcea01/25.2.4165

Yu, Y., & Yu, H. J. (2014). Development and application of molecular biology techniques in environmental treatment. *Applied Mechanics and Materials, 587–589*, 892–895. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.587-589.892

Zhang, G., Wei, L., Chang, C.-C., et al. (2016). Molecular biological methods in environmental engineering. *Water Environment Research, 88*(10), 947–960. https://doi.org/10.2175/106143016X14696400494371

Zheng, W. (2023). Application of molecular biology technologies in environmental restoration. *Highlights in Science, Engineering and Technology, 60*, 120–128. https://doi.org/10.54097/5bp8d611

Zizka, V. M. A., Koschorreck, J., Khan, C. C., et al. (2022). Long-term archival of environmental samples empowers biodiversity monitoring and ecological research. *Environmental Sciences Europe, 34*(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12302-022-00618-y